


担当医/指導医	/
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

身長: cm 体重: Kg
体表面積 m²

食道癌 FP+RT療法(RTOGレジメン)

投与開始日 年 月 日



CDDPを1日目に点滴静注、5-FUを4日間持続静注するスケジュールを4週ごとに計4コース
最初の2コースは、放射線と同時併用

- CDDP 75mg/m² Day 1 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)
- 5-FU 1000mg/m² Day 1~4 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)

【投与スケジュール】

Day 1	1) ラクテックG 500mL 2V EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 2A 5-FU ()mg	24時間	メイン
	内服薬 アプレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用		
	2) ヴィーンF 500mL 1V 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 8mL	1時間	側管
	3) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V デキサート 1.65mg 6A	15分	側管
	4) マンニトールS 300mL 1V	1時間	側管
	5) 生食 350mL シスプラチン ()mg	2時間	側管
Day 2, 3	6) EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 1A ピタメジン 1V	2時間	側管
	1) ラクテックG 500mL 2V EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 2A 5-FU ()mg	24時間	メイン
	内服薬アプレピタントcp80mg 午前中服用		
	2) 生食 100mL 1V デキサート 1.65mg 4A	30分	側管
Day 4	3) EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 1A ピタメジン 1V	2時間	側管
	4) ラクテックG 500mL 1V ラシックス 0.5A	3時間	側管
	1) ラクテックG 500mL 2V EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 2A 5-FU ()mg	24時間	メイン
Day 4	2) 生食 100mL 1V デキサート 1.65mg 4A	30分	側管
	3) EL-3号 500mL 1A プリンペラン 10mg 1A ピタメジン 1V	2時間	側管