

担当医/指導医			/		
目的			<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助		
告知程度			<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容			<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導			<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()		
身長:	cm	体重:	Kg		
体表面積		m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

食道癌 FN療法

投与開始日 年 月 日 1コース 4週間(28日)

- 5-FU 800mg/m² Day 1~5 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
 (5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)
- アクプラ 90mg/m² Day 1 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
 (NDP: 一般名ネダプラチン、商品名アクプラ)

【投与スケジュール】

Day	投与内容	薬剤	濃度	容量	ルート	時間	部位	備考
Day 1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	1V			15分	側管①	
	デキサート	1.65mg	6A					
	2) ソルデム1輸液	500mL	1A			12時間	メイン	
	3) 生食	250mL	1V			24時間	側管①	ソルデム1輸液と一緒に
	5-FU	()mg						
	4) 生食	50mL	1A				側管②	アクプラのルートキープ・フラッシュ用
5) 生食	250mL	1V			1.5時間	側管②		
Day 2, 3, 4	6) ソルデム1輸液	500mL	1A			12時間	メイン	
	1) 生食	50mL	1V			15分	側管②	
	デキサート	1.65mg	4A					
	2) ソルデム1輸液	500mL	1A			12時間	メイン	
Day 5	3) 生食	250mL	1V			24時間	側管①	ソルデム1輸液と一緒に
	5-FU	()mg						
	4) ソルデム1輸液	500mL	1A			12時間	メイン	
	1) 生食	50mL	1V			15分	側管②	
	デキサート	1.65mg	4A					
2) ソルデム1輸液	500mL	1A			12時間	メイン		
5) 生食	50mL	1A				側管①	ルートフラッシュ用	

特記事項