

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積 m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

食道癌 キイトルーダ+FP療法 (キイトルーダ3週間毎)				
投与開始日 年 月 日			1コース 3週間	
●	キイトルーダ	200mg/body Day 1 3週間毎 (一般名:ペムプロリスマブ、商品名:キイトルーダ)	投与量: 200	mg
●	5-FU	800mg/m ² Day 1~5 3週間毎 (5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)	計算量: mg	投与量: mg
●	CDDP	80mg/m ² Day 1 3週間毎 (CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)	計算量: mg	投与量: mg
【投与スケジュール】				
Day 1	1) 生食	50mL	1V	メイン
	2) 生食	100mL	1V	30分 側管①
		キイトルーダ (200)mg		
	3) 生食	50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロ/セトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	1V	15分 メイン
		デキサート 1.65mg	6A	
	5) EL-3号	500mL	1V	12時間 側管②
	6) 生食	500mL	1V	24時間 側管① EL-3号と一緒に
		5-FU ()mg		
	7) ヴィーンF	500mL	1V	1時間 側管③
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
内服薬 アブレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用				
	8) マンニトールS	300mL	1V	1時間 側管③
	9) 生食	350mL		2時間 側管③の側管
		シスプラチン ()mg		
	10) ラクテックG	500mL	1V	2時間 側管③
		プリンパラン 10mg	1A	
	11) EL-3号	500mL	1V	12時間 側管②
内服薬アブレピタントcp80mg 午前中服用				
Day 2, 3	1) 生食	50mL	1V	15分 メイン
		デキサート 1.65mg	4A	
	2) EL-3号	500mL	1V	6時間 側管②
		プリンパラン 10mg	1A	
	3) 生食	500mL	1V	24時間 側管① EL-3号・ラクテックGと一緒に
		5-FU ()mg		
	4) ラクテックG	500mL	1V	6時間 側管②
	5) EL-3号	500mL	1V	6時間 側管②
	6) ラクテックG	500mL	1V	6時間 側管②
Day 4, 5	1) 生食	50mL	1V	15分 メイン
		デキサート 1.65mg	4A	
	2) EL-3号	500mL	1V	8時間 側管②
		プリンパラン 10mg	1A	
	3) 生食	500mL	1V	24時間 側管① EL-3号・ラクテックGと一緒に
		5-FU ()mg		
	4) ラクテックG	500mL	1V	8時間 側管②
	5) EL-3号	500mL	1V	8時間 側管②
	6) 生食	50mL	1V	ルートフラッシュ用(Day5のみ)
特記事項 ★キイトルーダは、0.2~5µmのインラインフィルター付きの点滴セットを使用すること。				