

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()	
身長: cm 体重: Kg		
体表面積 m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

食道癌 キイトルーダ+FP療法 (キイトルーダ6週間毎)			
投与開始日	年 月 日	1コース 6週間	
● キイトルーダ 400mg/body Day 1	6週間毎	投与量: 400	mg
(一般名:ペムプロリスマブ、商品名:キイトルーダ)			
● 5-FU 800mg/m ² Day 1~5, 22~26	3週間毎	計算量: mg	投与量: mg
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)			
● CDDP 80mg/m ² Day 1, 22	3週間毎	計算量: mg	投与量: mg
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)			
【投与スケジュール】 Day1-21			
Day1	1) 生食 50mL	1V	メイン
	2) 生食 100mL	1V	30分 側管①
	キイトルーダ (400)mg		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分 メイン
	デキサート 1.65mg	6A	
	5) EL-3号 500mL	1V	12時間 側管②
	6) 生食 500mL	1V	24時間 側管① EL-3号と一緒に
	7) ヴィーンF 500mL	1V	1時間 側管③
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
	内服薬 アブレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用		
8) マンニトールS 300mL	1V	1時間 側管③	
9) 生食 350mL		2時間 側管③の側管	
シスプラチン ()mg			
10) ラクテックG 500mL	1V	2時間 側管③	
プリンペラン 10mg	1A		
11) EL-3号 500mL	1V	12時間 側管②	
内服薬アブレピタントcp80mg 午前中服用			
Day2, 3	1) 生食 50mL	1V	15分 メイン
	デキサート 1.65mg	4A	
	2) EL-3号 500mL	1V	6時間 側管②
	プリンペラン 10mg	1A	
	3) 生食 500mL	1V	24時間 側管① EL-3号・ラクテックGと一緒に
	5-FU ()mg		
4) ラクテックG 500mL	1V	6時間 側管②	
5) EL-3号 500mL	1V	6時間 側管②	
6) ラクテックG 500mL	1V	6時間 側管②	
Day4, 5	1) 生食 50mL	1V	15分 メイン
	デキサート 1.65mg	4A	
	2) EL-3号 500mL	1V	8時間 側管②
	プリンペラン 10mg	1A	
	3) 生食 500mL	1V	24時間 側管① EL-3号・ラクテックGと一緒に
	5-FU ()mg		
4) ラクテックG 500mL	1V	8時間 側管②	
5) EL-3号 500mL	1V	8時間 側管②	
6) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ用(Day5のみ)	
特記事項	※Day22以降は次頁を参照 ★キイトルーダは、0.2~5μmのインラインフィルター付きの点滴セットを使用すること。		

【投与スケジュール】 Day22-42					
Day22	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート 1.65mg	1V 6A	15分	メイン	
	2) EL-3号 500mL	1V	12時間	側管②	
	3) 生食 500mL 5-FU ()mg	1V	24時間	側管①	EL-3号 と一緒に
	4) ヴィーンF 500mL 硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	1V 8mL	1時間	側管③	
	内服薬 アブレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用				
	5) マニトールS 300mL	1V	1時間	側管③	
	6) 生食 350mL シスプラチン ()mg		2時間	側管③の側管	
	7) ラクテックG 500mL プリンパラン 10mg	1V 1A	2時間	側管③	
8) EL-3号 500mL	1V	12時間	側管②		
Day23、24	内服薬アブレピタントcp80mg 午前中服用				
	1) 生食 50mL デキサート 1.65mg	1V 4A	15分	メイン	
	2) EL-3号 500mL プリンパラン 10mg	1V 1A	6時間	側管②	
	3) 生食 500mL 5-FU ()mg	1V	24時間	側管①	EL-3号・ラクテック Gと一緒に
	4) ラクテックG 500mL	1V	6時間	側管②	
	5) EL-3号 500mL	1V	6時間	側管②	
Day25、26	1) 生食 50mL デキサート 1.65mg	1V 4A	15分	メイン	
	2) EL-3号 500mL プリンパラン 10mg	1V 1A	8時間	側管②	
	3) 生食 500mL 5-FU ()mg	1V	24時間	側管①	EL-3号・ラクテック Gと一緒に
	4) ラクテックG 500mL	1V	8時間	側管②	
	5) EL-3号 500mL	1V	8時間	側管②	
	6) 生食 50mL	1V		ルートフラッシュ用(Day26のみ)	

★治療スケジュール

