

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師( ) 薬剤師( )	
身長: cm 体重: Kg		
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

食道癌 オプジーボ+FP療法 (オプジーボ2週間毎)			
投与開始日		年 月 日	1コース 4週間
● オプジーボ	240mg/body Day 1, 15 2週間毎 (Nivo: 一般名ニボルマブ、商品名オプジーボ)	投与量: 240 mg	
● 5-FU	800mg/m <sup>2</sup> Day 1~5 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg (5-FU: 一般名フルオウラシル、商品名フルオウラシル)		
● CDDP	80mg/m <sup>2</sup> Day 1 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg (CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)		
【投与スケジュール】			
Day 1	1) 生食 50mL	1V	メイン
	2) 生食 100mL オプジーボ ( 240 )mg	1V	60分 側管①
	全量100mLになるように、生食の量を調節		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート 1.65mg	1V 6A	30分 メイン
	5) EL-3号 500mL	1V	12時間 側管②
	6) 生食 500mL 5-FU ( )mg	1V	24時間 側管①
	EL-3号と一緒に		
	7) ヴィーンF 500mL 硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	1V 8mL	1時間 側管③
	内服薬 アプレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用		
	8) マンニトールS 300mL	1V	1時間 側管③
9) 生食 350mL シスプラチン ( )mg		2時間 側管③の側管	
10) ラクテックG 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	2時間 側管③	
11) EL-3号 500mL	1V	12時間 側管②	
Day 2, 3	内服薬アプレピタントcp80mg 午前中服用		
	1) 生食 50mL デキサート 1.65mg	1V 4A	15分 メイン
	2) EL-3号 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	6時間 側管②
	3) 生食 500mL 5-FU ( )mg	1V	24時間 側管①
	EL-3号・ラクテックGと一緒に		
	4) ラクテックG 500mL	1V	6時間 側管②
Day 4, 5	5) EL-3号 500mL	1V	6時間 側管②
	6) ラクテックG 500mL	1V	6時間 側管②
	1) 生食 50mL デキサート 1.65mg	1V 4A	15分 メイン
	2) EL-3号 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	8時間 側管②
	3) 生食 500mL 5-FU ( )mg	1V	24時間 側管①
	EL-3号・ラクテックGと一緒に		
4) ラクテックG 500mL	1V	8時間 側管②	
5) EL-3号 500mL	1V	8時間 側管②	
6) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ用(Day5のみ)	
【投与スケジュール】			
Day 15	1) 生食 50mL	1V	ルートキープ・ルートフラッシュ
	2) 生食 100mL オプジーボ ( 240 )mg	1V	60分
全量100mLになるように、生食の量を調節			
特記事項	★オプジーボ投与時は、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて点滴静注		