

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

食道癌 オプジーボ+FP療法 (オプジーボ4週間毎)

投与開始日 年 月 日 1コース 4週間

- オプジーボ 480mg/body Day 1 4週間毎 投与量: 480 mg
(Nivo: 一般名ニボルマブ、商品名オプジーボ)
- 5-FU 800mg/m² Day 1~5 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)
- CDDP 80mg/m² Day 1 4週間毎 計算量: mg 投与量: mg
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 50mL 1V	メイン		
	2) 生食 100mL 1V	側管①	全量100mLになるように、生食の量を調節	
	オプジーボ (480)mg	60分		
	3) 生食 50mL 1V	2)のルートフラッシュ		
	4) パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V	30分	メイン	
	デキサート 1.65mg 6A			
	5) EL-3号 500mL 1V	12時間	側管②	
	6) 生食 500mL 1V	24時間	側管①	
	5-FU ()mg		EL-3号と一緒に	
	7) ヴィーンF 500mL 1V	1時間	側管③	
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 8mL			
内服薬 アブレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間~1時間30分前に服用				
8) マンニトールS 300mL 1V	1時間	側管③		
9) 生食 350mL	2時間	側管③の側管		
シスプラチン ()mg				
10) ラクテックG 500mL 1V	2時間	側管③		
プリンパラン 10mg 1A				
11) EL-3号 500mL 1V	12時間	側管②		
内服薬アブレピタントcp80mg 午前中服用				
Day2, 3	1) 生食 50mL 1V	15分	メイン	
	デキサート 1.65mg 4A			
	2) EL-3号 500mL 1V	6時間	側管②	
	プリンパラン 10mg 1A			
	3) 生食 500mL 1V	24時間	側管①	EL-3号・ラクテックGと一緒に
	5-FU ()mg			
4) ラクテックG 500mL 1V	6時間	側管②		
5) EL-3号 500mL 1V	6時間	側管②		
6) ラクテックG 500mL 1V	6時間	側管②		
Day4, 5	1) 生食 50mL 1V	15分	メイン	
	デキサート 1.65mg 4A			
	2) EL-3号 500mL 1V	8時間	側管②	
	プリンパラン 10mg 1A			
	3) 生食 500mL 1V	24時間	側管①	EL-3号・ラクテックGと一緒に
	5-FU ()mg			
4) ラクテックG 500mL 1V	8時間	側管②		
5) EL-3号 500mL 1V	8時間	側管②		
6) 生食 50mL 1V			ルートフラッシュ用(Day5のみ)	

特記事項 ★オプジーボ投与時は、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて点滴静注