


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( )	薬剤師( )
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/>	確認済み

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

### 胃癌 カンプト単剤療法 (A法)



1クール 4週間  
CPT-11は、Day1、8、15に投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

● CPT-11 100mg/m<sup>2</sup> Day 1, 8, 15 計算量: mg 投与量: mg  
(CPT-11 : 一般名イリノテカン、商品名カンプト)

#### 【投与スケジュール】

Day1, 8, 15	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	5A	
	2) 5%ブドウ糖液 250mL	1V	90分
	ブスコパン 20mg	1A	
カンプト ( )mg			
	3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ 下痢に注意！  
便通コントロールのため、必要時、重曹、酸化マグネシウム、ウルソ錠、半夏瀉心湯を処方。

特記事項