担当医/指導医	／
目的	☐ 積極的治療　☐ 症状緩和
	☐ 術前補助　☐ 術後補助
告知程度	☐全告知 ☐部分告知 ☐未告知
告知内容	☐ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	☐ 抗癌剤を使用する
服薬指導	☐ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m^2	HBV感染スクリーニング	☐ 確認済み

胃癌　カンプト単剤療法（B法）



150mg/m^2を2週間間隔で2～3回点滴静注し、
少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして、
投与を繰り返す。

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● CPT−11　　150mg/m^2　　Day 1，15　計算量:　　mg　投与量:　　mg

（CPT-11：一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【投与スケジュール】

Day1，15	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1．65mg	5A	
	2） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	
	ブスコパン 20mg	1A	90分
	カンプト （ ）mg		
	3） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ 下痢に注意！
便通コントロールのため、必要時、重曹、酸化マグネシウム、ウルソ錠、半夏瀉心湯を処方。

特記事項