


がん化学療法治療計画書 胃-⑬ 2019.11

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

胃癌 ドセタキセル+S-1併用療法

DOC 40mg/m²



1クール 3週間
S-1は、2週間内服後、1週間休薬
DOCは、Day1投与

投与開始日 年 月 日 _____ クール予定 _____

- S-1 80mg/m² Day 1~14 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg
- ドセタキセル 40mg/m² Day 1 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg
(DOC : 一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソール)

【投与スケジュール】

Day1	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ 1V	30分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL 4A	
	2) 5%Tz 250mL 1V	1時間
	ドセタキセル () mg	
3) 生食 50mL 1V	ルートフラッシュ	
(内服)デカドロン錠 4mg 夕食後 (省略可)		
Day2~3	(内服)デカドロン錠 8mg 分2 朝・夕食後 (省略可)	
★エタノールが含有されているので、必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認 ★ドセタキセルは点滴開始から約15分間は点滴速度を少し遅めにして、全身状態を観察する。		