がん化学療法治療計画書 胃癌-(16) 2016.10

| | 担当医/指導医 | / | | |
|---------------------|---------|---------------------|--|--|
| | 目的 | □ 積極的治療 □ 症状緩和 | | |
| | נחם | □ 術前補助 □ 術後補助 | | |
| | 告知程度 | 口全告知 口部分告知 口未告知 | | |
| | 告知内容 | □ 癌(原発 ・ 再発 ・ 進行) | | |
| | 디세이샵 | □ 抗癌剤を使用する | | |
| | 服薬指導 | □ 依頼する | | |
| 身長: cm 体重: Kg | 加米扣等 | 看護師() 薬剤師() | | |
| 体表面積 m ² | HBV感染スク | リーニング ロ 確認済み | | |
| 胃癌 ドセタキセル単独療法 | | | | |

| 胃癌 ドセタキセル単独療法 | | |
|--|--|--|
| | DOCは、Day1投与 1クール 3週間 | |
| 投与開始 | 日 年 月 日 ケール予定 | |
| | ・60~75mg/m ² Day 1 <u>計算量: mg 投与量: mg</u> OC:一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテール) | |
| 【投与スケジュール】 | | |
| | 1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ 1V 30分 デキサート注射液1.65mg/0.5mL 4A | |
| Day1 | 2) 5%Tz 250mL 1V 1時間 ドセタキセル () mg | |
| | 3) 生食 50mL 1V ルートフラッシュ | |
| | (内服)デカドロン錠 4mg 夕食後 (省略可) | |
| Day2~3 | (内服)デカドロン錠 8mg 分2 朝・夕食後 (省略可) | |
| ★エタノールが含有されているので、 <u>必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認</u> ★ドセタキセルは点滴開始から約15分は点滴速度を少し遅めにして、全身状態を観察する。 | | |