

担当医/指導医	/		
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和	
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)		
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する		
	看護師() 薬剤師()		
身長: cm 体重: Kg			
体表面積 m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

胃癌 ハーセプチン+XP療法				
ハーセプチン 8mg/Kg (2回目以降6mg/Kg)	1コース 3週間			
↓	カペシタビンは、2週間内服後、1週間休薬			
CDDP 80mg/m ²	(Day1夕からDay15朝まで)			
↓	ハーセプチン、CDDPIは、Day1投与			
カペシタビン	(ハーセプチンは初回8mg/kgを90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は投与時間を30分まで短縮可)			
Day 1 15 21				
投与開始日	年	月	日	クール予定
●ハーセプチン	初回	8mg/kg	Day1	投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL
<体重あたりの換算式>	初回			抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 8 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$
●ハーセプチン	2回目以降	6mg/kg	Day1	投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL
<体重あたりの換算式>	2回目以降			抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 6 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$
●カペシタビン	1000mg/m ² /回	Day 1夕~15朝	計算量: _____ mg	投与量: _____ mg
●CDDP	80mg/m ²	Day 1	計算量: _____ mg	投与量: _____ mg
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)				
【Day -1~2の投与スケジュール】				
Day -1	EL-3号	500mL	1V	2時間
	EL-3号	500mL	1V	2時間
Day 1	1)	EL-3号 500mL	1V	1時間
	2)	ヴァーンF 500mL	1V	1時間
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
	3)	生食 250mL	1V	90分
		ハーセプチン ()mg		
		アプレピタントカプセル 125mg シスプラチン投与開始1時間前内服		
	4)	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
		デキサート 1.65mg	6A	
	5)	マンニトールS 300mL	1V	1時間
6)	生食 400mL		2時間	
	シスプラチン ()mg			
7)	生食 100mL	1V	30分	
	プリンペラン 10mg	3A		
8)	ラクテックG 500mL	1V	2時間	
9)	ラクテックG 500mL	1V	2時間	
Day 2	アプレピタントカプセル 80mg 午前中内服			
	EL-3号	500mL	1V	2時間
	EL-3号	500mL	1V	2時間
	側) 生食	50mL	1V	15分
	デキサート 1.65mg	4A		
【Day3~4の内服薬】				
Day3	アプレピタント(80mg)	1cp	午前中	1日間
Day3~4	デカドロン(4mg)	2錠	分2朝・昼食後	2日間