がん化学療法治療計画書　胃-(25) 2021.1

担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

胃癌　サイラムザ単独療法

2週間に1回、点滴静注

投与開始日　　年　　月　　日

● サイラムザ　8mg/kg　Day 1　　計算量:　　mg　投与量:　　mg

（一般名:ラムシルマブ、 商品名:サイラムザ）

＜体重あたりの換算式＞　抜き取り量（ｍＬ）＝体重（kg）× $\frac{8\ (mg/kg)}{10\ (mg/mL)}$

【投与スケジュール】

Day1	1） 生食　100mL	1V		30分
	ポララミン　5mg	1A		
	2） 生食　250mL	1V	全量250mLになるように、生食の量を調節	投与時間は下記を参照
	サイラムザ　（　　）	mg		
	3） 生食　50mL	1V		ルートフラッシュ

★ 専用の点滴セットを使用すること。（0．2又は0．22ミクロンのフィルター付きの点滴セット）

★ 初回投与時は60分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。