担当医/指導医	／
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

胃癌　5-FU＋レボホリナート療法　（RPMIレジメン）



1コース 8週
6週weekly投薬、2週休薬
※Day 43、50は休薬

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● 5－FU　600mg/m^2

Day 1, 8, 15, 22, 29, 36　計算量:　　mg　投与量:　　mg

（5-FU：一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル）

● レボホリナート　250mg/m^2

Day 1, 8, 15, 22, 29, 36　計算量:　　mg　投与量:　　mg

【Day 1, 8, 15, 22, 29, 36の投与スケジュール】

Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	1） 生食　50mL	1V	15分	メイン
	デキサート　1．65mg	4A		
	2） 5%ブドウ糖液　500mL	1V	2時間	側管②
	レボホリナート　（	）mg		
	3） 生食	30mL	全開	側管① レボホリナート開始60分後
	5－FU　（	）mg		
	3） 生食　50mL	1V		ルートフラッシュ用