


担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和	
		<input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg	HBV感染スクリーニング	
体表面积 m ²		<input type="checkbox"/> 確認済み	

胃癌 5FU/l-LV療法 sLV5FU2 regimen (インフューザーポンプ使用)



1クール 2週間

投与開始日	年	月	日	クール予定	
● レボホリナート	200mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● 5-FU(急速静注)	400 mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● 5-FU(持続静注)	2400 mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg

(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)

【投与スケジュール】

Day1~2	30分	1) グラニセトロン点滴静注液 1V 3mg 100mL デキササート 1.65mg 5A	
	2時間	2) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート()mg	
			3) 生食 30mL bolus5-FU ()mg
	インフューザー使用 46時間	4) 生食 100mL 2V 5-FU ()mg	全開 <input type="checkbox"/> 全量230mLになるように、 生食の量を調節
		5) ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ*10mL 1A	

特記事項