## がん化学療法治療計画書 胃-(36) 2019.9

	担当医 /指導医	/
	目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和
		□ 術前補助 □ 術後補助
	告知程度	口全告知 口部分告知 口未告知
	告知内容	□ 癌(原発・再発・進行)
		□ 抗癌剤を使用する
		□ 依頼する
身長: cm 体重: Kg	服薬指導	看護師( ) 薬剤師( )
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染フ	スクリーニング 口 確認済み

<b>—</b>		11	_	
	1111	$\pi$ –	• <i>J</i> :	療法
月池	H			<b>ルスノム</b>

投与開始日	午	- A		内服予定期間 (	)
仅分册知口	+	Л	ы		,

【効能・効果】がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌

【用法・用量】朝食後および夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。 これを2回繰り返したのち14日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。

体表面積(m²)	初回基準量
□1.07未満	35mg/回(70mg/日)
□ 1. 07以上~1. 23未満	40mg/回(80mg/日)
□ 1. 23以上~1. 38未満	45mg/回(90mg/日)
□ 1. 38以上~1. 53未満	50mg/回(100mg/日)
□ 1. 53以上~1. 69未満	55mg/回(110mg/日)
□ 1. 69以上~1. 84未満	60mg/回(120mg/日)
□ 1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日)
□ 1. 99以上~2. 15未満	70mg/回(140mg/日)
口 2. 15以上	75mg/回(150mg/日)

特記事項