


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

胃癌 オブジーボ+modified-FOLFOX6療法(インフューザーポンプ使用)



投与開始日	年	月	日	クール予定	
● オブジーボ	240mg/body	投与量: 240 mg			
(一般名:ニボルマブ、商品名:オブジーボ)					
● レボホリナート	200mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg		
● L-OHP	85mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg		
(L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット)					
● 5-FU(急速静注)	400mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg		
● 5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg		
(5-FU: 一般名フルオウラシル、商品名フルオウラシル)					

【投与スケジュール】

30分	1) 生食 50mL 1V	全量100mLになるように、 生食の量を調節
	2) 生食 100mL 1V	
	オブジーボ (240)mg	
30分	3) 生食 50mL 1V ← 2)のルートフラッシュ	《 5-1)と5-2)は同時に投与 》 5-2) 5%TZ 250mL 1V エルプラット ()mg
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V	
	デキサート 1.65mg 5A	
2時間	5-1) 5%TZ 250mL 1V	5-2) 5%TZ 250mL 1V エルプラット ()mg
	レボホリナート ()mg	
インフューザー使用 46時間	6) 生食 30mL 全開 bolus5-FU ()mg	全量230mLになるように、 生食の量を調節
	7) 生食 100mL 2V	
	5-FU ()mg	
	8) ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL 1A	

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	1錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----

★ オブジーボの投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。