担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する
	看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長：　cm	体重：　Kg
体表面積	m^2

胃癌　ハーセプチン+XELOX療法

ハーセプチン 8mg/Kg(2回目以降6mg/Kg)
↓
L-OHP 130mg/m^2
↓
カペシタビン

Day 1　15　21

1コース　3週間
ハーセプチン、L-OHPは、Day1投与
（ハーセプチンは初回90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は投与時間を30分まで短縮可）
カペシタビンは、2週間内服後、1週間休薬

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● ハーセプチン　初回　8mg/kg　Day1　投与量：　mg　抜き取り量：　mL

＜体重あたりの換算式＞　初回　抜き取り量（mL）　$\frac{体重（kg）\times 8（mg/kg）}{21（mg/mL）}$

● ハーセプチン　2回目以降　6mg/kg　Day1　投与量：　mg　抜き取り量：　mL

＜体重あたりの換算式＞　2回目以降　抜き取り量（mL）　$\frac{体重（kg）\times 6（mg/kg）}{21（mg/mL）}$

● カペシタビン　裏表参照　14日間　投与量：　mg
（1日目の夕～15日目の朝まで投与）

● L－OHP　130mg/m^2　Day 1　計算量：　mg　投与量：　mg
（L－OHP ： 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット）

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1） 生食　50mL	1V	ルートキープ	
	2） 生食　250mL ハーセプチン　（　　）mg	1V	90分	初回90分以上かけて投与し、忍容性が良好であれば、2回目以降は投与時間を30分まで短縮可
	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート　1.65mg	1V 5A	15分	
	2） 5%ブドウ糖液　250mL エルプラット　（　　）mg	1V	120分	
	3） 生食　50mL	1V	ルートフラッシュ	