担当医/指導医	／
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）

身長:　　cm	体重:　　Kg	HBV感染スクリーニング	□ 確認済み
体表面積　　m^2			

大腸癌　5-FU＋レボホリナート療法　（5-FU/ℓ-LV）



1クール 8週
6週weekly投薬、2週休薬
※Day　43、50は休薬

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● 5－FU　　600mg/m^2

Day　1, 8, 15, 22, 29, 36　　計算量:　　mg　　投与量:　　mg

（5-FU：一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル）

● レボホリナート　　250mg/m^2

Day　1, 8, 15, 22, 29, 36　　計算量:　　mg　　投与量:　　mg

【Day　1, 8, 15, 22, 29, 36の投与スケジュール】

Day　1, 8, 15, 22, 29, 36	1） 5%ブドウ糖液　500mL　1V レボホリナート　（　）mg	点滴	2時間	
	2） 5－FU　（　）mg	静注 3分以内で緩徐に	レボホリナート開始60分後