


担当医/指導医		/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和	
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)		
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する		
	看護師()	薬剤師(
身長: cm	体重: Kg		
体表面積 m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み



投与開始日	年	月	日	クール予定		
● カンプト	100mg/m ²	Day 1, 8	計算量:	mg	投与量:	mg
(CPT-11 : 一般名イリノテカン、商品名カンプト)						
● レボホリナート	10mg/m ²	Day 1, 8	計算量:	mg	投与量:	mg
(5-FU : 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)						

【Day1, Day8の投与スケジュール】

Day1, Day8	1)	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
		デキサート 1.65mg	5A	
	2)	5%ブドウ糖液 250mL	1V	
		ブスコパン 20mg	1A	90分
		カンプト ()mg		
	3)	生食 50mL	1V	15分
		レボホリナート ()mg		
	4)	5-FU ()mg		静注
	5)	生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★下痢に注意！
便通コントロールのため、必要時、重曹、酸化マグネシウム、ウルソ錠、半夏瀉心湯を処方。