担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する
	看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

カペシタビン:B法　結腸・直腸癌（補助化学療法）

投与開始日　　年　　月　　日　　内服予定期間（　　）

□ **B法**　**14日間連日内服、7日間休薬**（副作用に応じて投与間隔変更することあり）

体表面積（m^2）	投与量
□ 1．33未満	3000mg/day（朝1500mg，夕1500mg）
□ 1．33以上～1．57未満	3600mg/day（朝1800mg，夕1800mg）
□ 1．57以上～1．81未満	4200mg/day（朝2100mg，夕2100mg）
□ 1．81以上	4800mg/day（朝2400mg，夕2400mg）
□ その他	（　　）mg/day（朝　　mg，夕　　mg）

《 参考 ： カペシタビン減量時の投与量:B法 》

体表面積（m^2）	1レベル減量時	2レベル減量時
1．13未満	1800mg/day	1200mg/day
1．13以上～1．21未満	2400mg/day	1200mg/day
1．21以上～1．45未満	2400mg/day	1800mg/day
1．45以上～1．69未満	3000mg/day	1800mg/day
1．69以上～1．77未満	3000mg/day	2400mg/day
1．77以上	3600mg/day	2400mg/day

特記事項