担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

大腸癌 カンプト単剤療法（A法）



1クール 4週間
CPT－11は、Day1、8、15に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● CPT－11　100mg/m^2　Day 1, 8, 15　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（CPT-11 ： 一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【投与スケジュール】

Day1, 8, 15	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1. 65mg	5A	
	2） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	90分
	ブスコパン 20mg	1A	
	カンプト （　　）mg		
	3） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ 下痢に注意！
便通コントロールのため、必要時、重曹、酸化マグネシウム、ウルソ錠、半夏寫心湯を処方。

特記事項