## がん化学療法治療計画書 大腸-① 2016.10

担当医/指		/	
	目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和	
	נים בו	□ 術前補助 □ 術後補助	
	告知程度	口全告知 口部分告知 口未告知	
	告知内容	□ 癌(原発・再発・進行)	
		□ 抗癌剤を使用する	
		□ 依頼する	
身長: cm 体重: Kg	服薬指導	看護師( ) 薬剤師( )	
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染スク	リーニング ロ 確認済み	

## 大腸癌 カンプト単剤療法(B法)

)

CPT-11	CPT-11	
150mg/m <sup>2</sup>	150mg/m²	
Day 1	15	(

150mg/m²を2週間間隔で2~3回点滴静注し、 少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして、 投与を繰り返す。

投与開始日 年 月 日 クール予定 ● CPT-11 150mg/m² Day 1, 15 <u>計算量: \_\_\_\_mg 投与量:</u> mg (CPT-11:一般名イリノテカン、商品名カンプト) 【投与スケジュール】 1) グラニセトロン点滴静注液 1V 3mg 100mL 30分 デキサート 1.65mg 5A 2) 5%ブドウ糖液 250mL 1V Day1, 15 ブスコパン 20mg 1A 90分 カンプト( ) mg 3) 生食 50mL 1V ルートフラッシュ ★ 下痢に注意! 便通コントロールのため、必要時、重曹、酸化マグネシウム、ウルソ錠、半夏寫心湯を処方。

特記事項