担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長：　　cm	体重：　　Kg
体表面積	m^2

大腸がん　5FU/ℓ-LV療法　sLV5FU2 regimen　（インフューザーポンプ使用）



1クール　2週間

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● レボホリナート	200mg/m^2	計算量：　mg	投与量：　mg
● 5－FU（急速静注）	400 mg/m^2	計算量：　mg	投与量：　mg
● 5－FU（持続静注）	2400 mg/m^2	計算量：　mg	投与量：　mg

（5-FU ： 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル）

【投与スケジュール】

Day1～3	30分	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg　100mL	1V
		デキサート　1.65mg	5A
	2時間	2） 5%TZ　250mL	1V
		レボホリナート（　　）mg	
		3） 生食　30mL bolus5－FU（　　）mg	全開
	インフューザー使用 46時間	4） 生食　100mL	2V
		5－FU（　　）mg	
		5）ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL	1A

全量230mLになるように、生食の量を調節

特記事項