担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm　体重:　　Kg	
体表面積　　m^2	

大腸癌　S-1＋カンプト(IRIS)療法



1クール 4週間
S－1は、2週間内服後、2週間休薬,
CPT－11は、Day1、15に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● S－1	80mg/m^2	Day 1～14	計算量:　　mg	投与量:　　mg
● CPT－11	125mg/m^2	Day 1, 15	計算量:　　mg	投与量:　　mg

（CPT-11 ： 一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【Day1, 15の投与スケジュール】

Day1, 15	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート 1.65mg	5A	
	2） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	90分
	ブスコパン 20mg	1A	
	カンプト　（　　）mg		
	3） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

特記事項