


担当医 / 指導医	/		
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和	
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)		
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する		
	身長: cm	体重: Kg	
	体表面積 m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み
		看護師()	薬剤師()

大腸癌 FOLFOX4+アバスチン併用療法



- Bevacizumab 5 or 10 mg/kg (BV: 一般名ベバシツマブ、商品名アバスチン) 投与量: mg 抜き取り量: mL
《必要抜き取り量計算式》 5mg/kgの場合抜き取り量 (mL) = 体重(kg) × 0.2 (mL/kg)
 《必要抜き取り量計算式》 10mg/kgの場合抜き取り量 (mL) = 体重(kg) × 0.4 (mL/kg)
- レボホリナート 100mg/m² 計算量: mg 投与量: mg
- L-OHP 85mg/m² (L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット) 計算量: mg 投与量: mg
- 5-FU(急速静注) 400mg/m² 計算量: mg 投与量: mg
- 5-FU(持続静注) 600mg/m² 計算量: mg 投与量: mg
(5-FU: 一般名フルオウラシル、商品名フルオウラシル)

【投与スケジュール】

開始()時	本管	側管	
Day1 15分 投与時間は 右記を参照 2時間	1) パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V デキサート 1.65mg 5A	投与時間: 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。 《3-1)と3-2)は同時に投与》	
	2) 生食 100mL 1V アバスチン ()mg		
	3-1) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ()mg		
	3-2) 5%TZ 250mL 1V エルプラット ()mg		
Day1 11時間 11時間	5) EL-3号 500mL 1V 5-FU ()mg	4) 生食 30mL bolus5-FU ()mg	
	6) EL-3号 500mL 1V 5-FU ()mg		
	Day2 2時間	7) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ()mg	
		8) 生食 30mL bolus5-FU ()mg	
Day2 11時間 11時間	9) EL-3号 500mL 1V 5-FU ()mg		
	10) EL-3号 500mL 1V 5-FU ()mg		
	11) 生食 50mL 1V ルートフラッシュ		

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	1錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----