担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

大腸癌　TEGAFOX＋アバスチン併用療法



1クール 3週間
UFT/LVは、2週間内服後、1週間休薬,
L-OHPとアバスチンは、Day1に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

- UFT　300mg/m^2　Day 1～14　計算量:　　mg　投与量:　　mg
- LV　75mg　Day 1～14　投与量:　75 mg
  （LV：一般名ホリナートカルシウム、商品名ホリナート）
- Bevacizumab　7.5mg/kg　Day 1　投与量:　　mg　抜き取り量:　　mL
  （BV：一般名ベバシズマブ、商品名アバスチン）
  《必要抜き取り量計算式》　7.5mg/kgの場合抜き取り量（mL）＝ 体重(kg)×0.3
- L－OHP　130mg/m^2　Day 1　計算量:　　mg　投与量:　　mg
  （L－OHP：一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット）

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分	
	デキサート 1.65mg	5A		
	2） 生食 100mL	1V	投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。	
	アバスチン　（　　）mg			
	3） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	120分	
	エルプラット　（　　）mg			
	4） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	