


ID:@PatientID
 名前:@PATIENTNAMEKANA 性別:
 @PATIENTSEXN
 生年月日:@PATIENTBIRTH2 年齢:
 @PATIENTAGEYEAR 歳
 診療科:@PATIENTFORMALSECTIONNAME

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()	
身長: cm 体重: Kg	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み
体表面積 m ²		

大腸癌 FOLFIRI療法+ベクティビックス (インフューザーポンプ使用)



投与開始日	年	月	日	クール予定	
●	ベクティビックス	6mg/kg	計算量: mg	投与量: mg	(一般名パニツムマブ、商品名ベクティビックス)
●	レボホリナート	200mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg	
●	CPT-11	150mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg	(CPT-11: 一般名イリリノテカン、商品名カンプト)
●	5-FU(急速静注)	400mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg	
●	5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	計算量: mg	投与量: mg	(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)

【投与スケジュール】

Day1~3	15分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V デキササート 1.65mg 5A		
	全開	2) 生食50mL 1V		
	1時間以上	3) 生食100mL ベクティビックス ()mg	ベクティビックスは1回投与量が1,000mgを超える場合生食で希釈し約150mLとし、90分以上で点滴	
	全開	4) 生食50mL 1V	《5-1)と5-2)は同時に投与》	
	2時間	5-1) 5%TZ 250mL 1V	90分	5-2) 5%TZ 250mL 1V
		レボホリナート ()mg		ブスコパン 20mg 1A カンプト ()mg
	インフューザー 46時間	7) 生食 100mL 2V 5-FU ()mg	全開	6) 生食 30mL bolus5-FU ()mg
		8) ヘパリンNa点滴用10単位/mLシリンジ10mL 1A		全量230mLになるように、生食の量を調節

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	1錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----

★ 本剤投与の際は、インラインフィルター(0.2ミクロン又は0.22ミクロン)を使用すること