


担当医 /指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
身長: cm 体重: Kg	HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み	
体表面積 m ²		

大腸癌 modified-FOLFOX6療法+ベクティビックス(インフューザーポンプ使用)



投与開始日 年 月 日 クール予定

- | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ● | ベクティビックス | 6mg/kg
(一般名パニツムマブ、商品名ベクティビックス) | 計算量: mg | 投与量: mg |
| ● | レボホリナート | 200mg/m ² | 計算量: mg | 投与量: mg |
| ● | L-OHP | 85mg/m ²
(L-OHP : 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット) | 計算量: mg | 投与量: mg |
| ● | 5-FU(急速静注) | 400mg/m ² | 計算量: mg | 投与量: mg |
| ● | 5-FU(持続静注) | 2400mg/m ²
(5-FU : 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル) | 計算量: mg | 投与量: mg |

【投与スケジュール】

Day1~3	15分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 1V 0.75mg/50mL	ベクティビックスは1回投与量が1,000mgを超える場合生食で希釈し約150mLとし、90分以上で点滴
	全開	デキサート 1. 65mg 5A	
	1時間以上	2) 生食50mL 1V	《 5-1)と5-2)は同時に投与 》
	全開	3) 生食100mL ベクティビックス ()mg	
	2時間	4) 生食50mL 1V	5-2) 5%TZ 250mL 1V
	インフューザー使用 46時間	5-1) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ()mg	エルプラット ()mg
	全開	6) 生食 30mL bolus5-FU ()mg	全量230mLに なるように、 生食の量を調節
		7) 生食 100mL 2V 5-FU ()mg	
	8) ヘパリンNa点滴用10単位/mLシリンジ10mL 1A		

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3 デカドロン(4mg) 1錠 分1朝食後 2日間

★ 本剤投与の際は、インラインフィルター(0.2ミクロン又は0.22ミクロン)を使用すること