担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm　体重:　　Kg	
体表面積　　m^2	

大腸癌　S-1＋カンプト(IRIS)+アバスチン併用療法



1クール 4週間
S－1は、2週間内服後、2週間休薬
BVとCPT－11は、Day1、15に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● S－1　80mg/m^2　Day 1～14　計算量:　mg　投与量:　mg

● Bevacizumab　5 mg/kg　Day 1, 15　投与量:　mg　抜き取り量:　mL

（BV：一般名ベバシズマブ、商品名アバスチン）

《必要抜き取り量計算式》　5mg/kgの場合抜き取り量（mL）＝ 体重(kg)×0．2

● CPT－11　100mg/m^2　Day 1, 15　計算量:　mg　投与量:　mg

（CPT-11：一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【Day1，15の投与スケジュール】

Day1，15	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート 1.65mg	5A	
	2） 生食 100mL	1V	投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
	アバスチン　（　　）mg		
	3） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	90分
	ブスコパン 20mg	1A	
	カンプト　（　　）mg		
	4） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

特記事項