| | |
|---|---|
| 担当医<br>/指導医 | / |
| 目的 | □ 積極的治療　□ 症状緩和 |
| | □ 術前補助　□ 術後補助 |
| 告知程度 | □全告知　□部分告知　□未告知 |
| 告知内容 | □ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） |
| | □ 抗癌剤を使用する |
| 服薬指導 | □ 依頼する<br>看護師（　　）　薬剤師（　　） |
| HBV感染スクリーニング | □ 確認済み |

| | |
|---|---|
| 身長:　　cm　体重:　　Kg | |
| 体表面積　　$m^2$ | |

# 大腸癌　ロンサーフ療法

投与開始日　　年　　月　　日　　内服予定期間（　　）

【効能・効果】 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌（標準的な治療が困難な場合に限る）

【用法・用量】 朝食後および夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。
これを2回繰り返したのち14日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。

| 体表面積（$m^2$） | 初回基準量 |
|---|---|
| □ 1．07未満 | 35mg/回（70mg/日） |
| □ 1．07以上～1．23未満 | 40mg/回（80mg/日） |
| □ 1．23以上～1．38未満 | 45mg/回（90mg/日） |
| □ 1．38以上～1．53未満 | 50mg/回（100mg/日） |
| □ 1．53以上～1．69未満 | 55mg/回（110mg/日） |
| □ 1．69以上～1．84未満 | 60mg/回（120mg/日） |
| □ 1．84以上～1．99未満 | 65mg/回（130mg/日） |
| □ 1．99以上～2．15未満 | 70mg/回（140mg/日） |
| □ 2．15以上 | 75mg/回（150mg/日） |

特記事項