


担当医/指導医	/
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する
	看護師( ) 薬剤師( )
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

### 大腸癌 FOLFOXIRI療法 (インフューザーポンプ使用)



1コース 2週間

投与開始日	年	月	日	コース予定	
● CPT-11	165mg/m <sup>2</sup>	計算量:	mg	投与量:	mg
(CPT-11: 一般名イリリテカン、商品名カンプト)					
● L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	計算量:	mg	投与量:	mg
(L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット)					
● レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	計算量:	mg	投与量:	mg
● 5-FU(持続静注)	3200mg/m <sup>2</sup>	計算量:	mg	投与量:	mg
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)					

#### 【投与スケジュール】

内服薬 アプレピタントcp125mg カンプト開始1時間~1時間30分前に服用					
Day1~3	15分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V	2時間	3-1) 5%TZ 250mL 1V	3-2) 5%TZ 250mL 1V
	1時間	デキサート 1.65mg 5A		レボホリナート ( )mg	
		2時間		2) 5%TZ 250mL 1V	5) 5-FU ( )mg
	2時間	3) ブスコパン 20mg 1A	レボホリナート ( )mg		
	48時間	4) カンプト ( )mg	5) 5-FU ( )mg		
《 3-1)と3-2)は同時に投与 》					
インフューザー 48時間					
		4) 生食 100mL 2V			全量240mLになるように、生食の量を調節
		5) ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL 1A			

#### 【Day2~4の内服薬】

Day2~3	アプレピタント(80mg)	1cp	午前中	2日間
Day2~4	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	3日間