


身長: _____ cm	体重: _____ Kg	体表面積 _____ m <sup>2</sup>	担当医/指導医 _____ / _____
			目的 <input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助
			告知程度 <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知
			告知内容 <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する
			服薬指導 <input type="checkbox"/> 依頼する 看護師(_____) 薬剤師(_____)
			HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み

### 大腸癌 ロンサーフ+アバスチン療法



1コース 4週間  
 ロンサーフは、朝食後および夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬。これを2回繰り返したのち14日間休薬。

投与開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ クール予定 \_\_\_\_\_

- ロンサーフ 下記参照 投与量: \_\_\_\_\_ mg  
 (day1~5内服、day6・7休薬。Day8~12内服、day13~28休薬)
- Bevacizumab 5mg/kg Day 1、15 計算量: \_\_\_\_\_ mg 投与量: \_\_\_\_\_ mg  
 (BV: 一般名ベパシツマブ、商品名アバスチン)

#### 【投与スケジュール】

Day 1、15	1) 生食 100mL 1V アバスチン ( )mg	投与時間は下記を参照
	2) 生食 50mL 1V	ルートキープ・フラッシュ用

- ★ 投与時間: 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- ★ 溶解方法: 必ず生理食塩液を使用する。本剤とブドウ糖溶液の混合は避ける。

#### 【ロンサーフ投与量】

体表面積(m <sup>2</sup> )	初回基準量
<input type="checkbox"/> 1.07未満	35mg/回(70mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.07以上~1.23未満	40mg/回(80mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.23以上~1.38未満	45mg/回(90mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.38以上~1.53未満	50mg/回(100mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.53以上~1.69未満	55mg/回(110mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.69以上~1.84未満	60mg/回(120mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日)
<input type="checkbox"/> 1.99以上~2.15未満	70mg/回(140mg/日)
<input type="checkbox"/> 2.15以上	75mg/回(150mg/日)

特記事項