


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
体表面積	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

大腸癌 FOLFIRI+ザルトラップ療法 (インフューザーポンプ使用)



1コース 2週間

投与開始日	年	月	日	クール予定	
● ザルトラップ	4mg/kg	投与量:	mg	抜き取り量:	mL
(一般名:アフリバセプト ベータ、商品名:ザルトラップ)					
● レボホリナート	200mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● CPT-11	150mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
(CPT-11: 一般名イリノテカン、商品名カンプト)					
● 5-FU(急速静注)	400mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● 5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
(5-FU: 一般名フルオウラシル、商品名フルオウラシル)					

【投与スケジュール】

Day1~3	30分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 1V 0.75mg/50mL デキサート 1.65mg 5A ポラミン 5mg 1A	2時間	
	1時間	2) 生食 100mL 1V ザルトラップ ()mg		
	15分	3) 生食 50mL 1V		
	90分	4-1) 5%TZ 250mL 1V		《4-1)と4-2)は同時に投与》
		プスコパン 20mg 1A		
		カンプト ()mg		
	インフューザー 46時間	4-2) 5%TZ 250mL 1V レボホリナート ()mg		5) 生食 30mL bolus5-FU ()mg
6) 生食 100mL 2V	7) ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL 1A			
全開				

全量230mLになるように、生食の量を調節

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	1錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----

★ 専用の点滴セットを使用すること。
(ザルトラップ:0.2ミクロンのポリエーテルスルホン製フィルターを用いて投与すること)