担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

大腸癌　mXELIRI療法



1コース 3週間
カペシタビンは、2週間内服後、1週間休薬,
カンプトは、Day1に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● カペシタビン　裏表参照　14日間　　投与量:　　mg
（1日目の夕～15日目の朝まで投与）

● CPT－11　200mg/m^2※　Day 1　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（CPT-11 ： 一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【投与スケジュール】

Day1	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート　1.65mg	5A	
	2） 5%ブドウ糖液　250mL	1V	90分
	ブスコパン　20mg	1A	
	カンプト　（　　）mg		
	3） 生食　50mL	1V	ルートフラッシュ

※ 以下のUGT1A1遺伝子多型を有する場合の開始用量は、150mg/m^2
＊6ホモ接合体、＊28ホモ接合体、＊6及び＊28ダブルヘテロ接合体

特記事項