担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

大腸癌　mXELIRI＋アバスチン併用療法

BV:7.5mg/kg
CPT-11:200mg/m^2
↓
カペシタビン
Day 1　　15　　21

1コース 3週間
カペシタビンは、2週間内服後、1週間休薬,
アバスチンとカンプトは、Day1に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● カペシタビン　裏表参照　14日間　　投与量:　　mg
（1日目の夕～15日目の朝まで投与）

● Bevacizumab　7．5mg/kg　Day 1　　投与量:　　mg　抜き取り量:　　mL
（BV：一般名ベバシツマブ、商品名アバスチン）

《必要抜き取り量計算式》　7.5mg/kgの場合抜き取り量（mL）＝ 体重(kg)×0．3

● CPT－11　200mg/m^2　Day 1　　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（CPT-11：一般名イリノテカン、商品名カンプト）

【投与スケジュール】

Day1，15	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート　1.65mg	5A	
	2） 生食　100mL	1V	投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
	アバスチン　（　　）	)mg	
	3） 5%ブドウ糖液　250mL	1V	90分
	ブスコパン　20mg	1A	
	カンプト　（　　）	)mg	
	4） 生食　50mL	1V	ルートフラッシュ

特記事項