がん化学療法治療計画書 大腸癌(61) 2021.1

担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

ビラフトビ + メクトビ + アービタックス療法

がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不要な進行・再発の結腸・直腸癌

投与開始日　　年　　月　　日

- ● アービタックス　初回 400mg/m^2　週1回　投与量:　　mg
- ● アービタックス　2回目以降 250mg/m^2　週1回　投与量:　　mg
  （一般名：セツキシマブ、商品名：アービタックス）
- ● ビラフトビ　通常投与量：300mg 1日1回　投与量:　　mg
  （一般名：エンコラフェニブ、商品名:ビラフトビ）
- ● メクトビ　通常投与量：45mg 1日2回　投与量:　　mg
  （一般名：ビニメチニブ、商品名：メクトビ）

【投与スケジュール】

初回	1） 生食 50mL デキサート 1．65mg	1V 4A	15分
	2） 生食 50mL ポララミン 5mg	1V 1A	15分
	3）生食 500mL アービタックス（　　）mg	1V	2時間
	4） 生食 100mL	1V	1時間経過観察（速度注意）
2回目以降	1） 生食 50mL デキサート 1．65mg	1V 4A	15分
	2） 生食 50mL ポララミン 5mg	1V 1A	15分
	3）生食 250mL アービタックス（　　）mg	1V	1時間
	4） 生食 100mL	1V	1時間経過観察（速度注意）