担当医 /指導医	/
目的	☐ 積極的治療　☐ 症状緩和
	☐ 術前補助　☐ 術後補助
告知程度	☐全告知 ☐部分告知 ☐未告知
告知内容	☐ 癌(原発 ・ 再発 ・ 進行)
	☐ 抗癌剤を使用する
服薬指導	☐ 依頼する 看護師(　　) 薬剤師(　　)
HBV感染スクリーニング	☐ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

ビラフトビ + アービタックス療法

がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不要な進行・再発の結腸・直腸癌

投与開始日　　年　　月　　日

- アービタックス　初回　400mg/m^2　週1回　投与量:　　mg
- アービタックス　2回目以降　250mg/m^2　週1回　投与量:　　mg
  (一般名:セツキシマブ、商品名:アービタックス)
- ビラフトビ　通常投与量:300mg　1日1回　投与量:　　mg
  (一般名:エンコラフェニブ、商品名:ビラフトビ)

【投与スケジュール】

初回	1) 生食　50mL	1V	15分
	デキサート　1．65mg	4A	
	2) 生食　50mL	1V	15分
	ポララミン　5mg	1A	
	3) 生食　500mL	1V	2時間
	アービタックス　(　)mg		
	4) 生食　100mL	1V	1時間経過観察(速度注意)
2回目以降	1) 生食　50mL	1V	15分
	デキサート　1．65mg	4A	
	2) 生食　50mL	1V	15分
	ポララミン　5mg	1A	
	3) 生食　250mL	1V	1時間
	アービタックス　(　)mg		
	4) 生食　100mL	1V	1時間経過観察(速度注意)