

身長: \$HEIGHT01_Doc cm 体重: \$WEIGHT01_Doc Kg		担当医/指導医	/	
体表面積 \$BDY00401_DOC m ²		目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
		告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
		告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
		服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()	
		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

非ホジキンリンパ腫 R-CHOP療法				
Day -2 -1 1 2 3 4 5 6 7・・・21				
リツキサン375mg/m ²	(●)	●	(●)	
ADR(ドキソルビシン) 50mg/m ²			●	
VCR(オンコピン) 1.4mg/m ² (max 2mg/body)			●	
CPA(エンドキサン) 750mg/m ²			●	
PSL(プレドニゾン) 100mg/body			● ● ● ● ●	
			1クール	21日
投与開始日	年	月	日	クール予定
● リツキサン 375mg/m ² Day-2、-1または1				計算量: mg 投与量: mg
(Rituximab : 一般名リツキシマブ、商品名リツキサン)				
● アドリアシン 50mg/m ² Day 1				計算量: mg 投与量: mg
(DXR : 一般名ドキソルビシン、商品名アドリアシン)				
● オンコピン 1.4mg/m ² Day 1				計算量: mg 投与量: mg
(Max : 2mg/body) (VCR : 一般名ビンクリスチン、商品名オンコピン)				
● エンドキサン 750mg/m ² Day 1				計算量: mg 投与量: mg
(CPA : 一般名シクロホスファミド、商品名エンドキサン)				
● プレドニゾン 60mg/m ² または100mg/body Day 1～5				計算量: mg 投与量: mg
(PSL : 一般名プレドニゾン、商品名プレドニゾン)				
【投与スケジュール】				
Day-2,-1 またはDay1	リツキサン投与開始30分前 抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等を投与			
	1) リツキサン(10mg/mL) ()mg			
	生食 ()mL 投与速度は裏面を参照			
	リツキサン最終濃度: 1mg/mL			
Day1～5	プレドニゾン錠()mg 毎日内服			
	内服薬 アプレピタントcp125mg アドリアシン開始1時間前に服用			
Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V		15分
	2) 生食 50mL アドリアシン ()mg	1V		15分
	3) 生食 50mL オンコピン ()mg	1V		15分
	4) 生食 500mL エンドキサン ()mg	1V		2時間
	5) 生食 50mL	1V		ルートフラッシュ
【Day2～3の内服薬】				
Day2～3	アプレピタント(80mg)	1cp	午前中	2日間