


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( ) 薬剤師( )	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長: \$HEIGHT01\_Doc cm 体重: \$WEIGHT01\_Doc Kg

体表面積 \$BDY00401\_DOC m<sup>2</sup>

### 尿路上皮癌 カルボプラチン、ゲムシタビン併用療法



1クール 3週間

CBDCAは、Day1に投与  
GEMは、Day1、8に投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

- GEM 800mg/m<sup>2</sup> Day 1、8 計算量:            mg 投与量:            mg  
(GEM:一般名ゲムシタビン、商品名ゲムシタビン)
- CBDCA カルバートの計算式 Day 1 計算量:            mg 投与量:            mg  
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

#### 【投与スケジュール】

Day1	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ 1袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL 6A	30分	
	2) 生食 100mL <b>ゲムシタビン (            ) mg</b>	30分	必ず30分間でDIV
	3) 生食 250mL <b>カルボプラチン (            ) mg</b>	1時間	
	4) 生食 50mL	全開(ルートフラッシュ)	
Day8	1) 生食 100mL デキサート注射液1.65mg/0.5mL 4A	30分	
	2) 生食 100mL <b>ゲムシタビン (            ) mg</b>	30分	必ず30分間でDIV
	3) 生食 50mL	全開(ルートフラッシュ)	

◆カルボプラチンはAUC=5で計算する。(初回投与で問題があれば変更)

【Day2~3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2~3	デカドロン(4mg)	2錠	分1 朝食後	2日間
--------	------------	----	--------	-----

特記事項