

がん化学療法治療計画書 前立腺-(3) 2016.5

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長: \$HEIGHT01_Doc cm 体重: \$WEIGHT01_Doc Kg
 体表面積 \$BDY00401_DOC m2

前立腺癌 ドセタキセル+プレドニゾン併用療法

ドセタキセルは、Day1 投与
 プレドニゾンは、5mg/回 を1日2回 朝・昼食後 連日経口投与 1コース 3週間

投与開始日 年 月 日 _____ コース予定 _____

- プレドニゾン 5mg/回 を1日2回 朝・昼食後 連日経口投与する
- ドセタキセル 75mg/m² Day1
 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg
 (DOC : 一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテル)

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 100mL	1V	15分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A	
	2) 生食 250mL	1V	1時間
	ドセタキセル () mg		
	3) 生食 50mL	1V	全開 (ルートフラッシュ)

★ エタノールが含有されているので、必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認

特記事項