

担当医/指導医		/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療		<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助		<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)		
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する		
	看護師() 薬剤師()		
身長: \$HEIGHT01_Doc cm	体重: \$WEIGHT01_Doc Kg		
体表面積	\$BDY00401_DOC	m ²	HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み

頭頸部癌 アービタックス+パクリタキセル併用療法

投与開始日	年	月	日	1コース 6週間(42日)	
● アービタックス	初回	400mg/m ²	週1回	投与量:	mg 抜き取り量: mL
● アービタックス	2回目以降	250mg/m ²	週1回	投与量:	mg 抜き取り量: mL
● パクリタキセル	80mg/m ²	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36		計算量:	mg 投与量: mg
(一般名パクリタキセル、商品名パクリタキセル)					

【投与スケジュール】

初回	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	6A	
	ポララミン 5mg	1A	
	2) 生食 250mL	1V	120分
	アービタックス ()mg		
2回目以降	3) 生食 100mL	1V	60分 経過観察 (速度注意)
	ファモチジン静注20mg	1A	
	4) 5%ブドウ糖液 250mL	1V	60分 (速度調節必要)
	パクリタキセル ()mg		
	5) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ