担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する
	看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長：　cm　体重：　Kg	
体表面積　m^2	

オプジーボ＋ヤーボイ療法

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High)を有する結腸・直腸癌

投与開始日　　年　　月　　日

1コース3週間

● オプジーボ　240mg
（Nivo ： 一般名ニボルマブ、 商品名オプジーボ）

投与量：　240　mg

● ヤーボイ　1mg/kg
（ Ipi ： 一般名イピリムマブ、 商品名ヤーボイ）

計算量：　mg　投与量：　mg

【投与スケジュール】

Day1	1） 生食　50mL	1V		ルートキープ
	2） 生食　100mL オプジーボ　（　240　）mg	1V	全量100mLになるように、生食の量を調節	60分
	3） 生食　50mL	1V		30分
	4） 生食　50mL ヤーボイ　（　　）mg	1V	全量30mLになるように、生食の量を調節	30分
	5） 生食　50mL	1V		ルートフラッシュ

★ オプジーボ投与時は、インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を用いて点滴静注

◆ ヤーボイ投与時は、インラインフィルター（0.2～1.2μmのメンブランフィルター）を用いて点滴静注

● オプジーボ・ヤーボイ併用療法を4回投与し、
その後、オプジーボ単独（レジメン、がん化学療法治療計画書　免疫-①）投与へ。

特記事項