

| | | | |
|---------------------|--------------|---|--|
| 担当医/指導医 | | / | |
| 目的 | | <input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 | |
| | | <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助 | |
| 告知程度 | | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 | |
| 告知内容 | | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) | |
| | | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する | |
| 服薬指導 | | <input type="checkbox"/> 依頼する | |
| | | 看護師() 薬剤師() | |
| 身長: cm 体重: Kg | | | |
| 体表面積 m ² | HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み | |

オプジーボ+ヤーボイ療法 (オプジーボ2週間毎)

- ☐ 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
☐ 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
☐ 根治切除不能な進行・再発の食道癌

投与開始日 年 月 日

1コース6週間

- オプジーボ 240mg Day1、15、29 投与量: 240 mg
(Nivo : 一般名ニボルマブ、商品名オプジーボ)
- ヤーボイ 1mg/kg Day1 計算量: mg 投与量: mg
(Ipi : 一般名イピリムマブ、商品名ヤーボイ)

【投与スケジュール】

| | |
|------|--|
| Day1 | 1) 生食 50mL 1V ルートキープ |
| | 2) 生食 100mL 1V 60分 オプジーボ (240)mg <small>全量100mLになるように、生食の量を調節</small> |
| | 3) 生食 50mL 1V 30分 |
| | 4) 生食 50mL 1V 30分 ヤーボイ ()mg <small>全量30mLになるように、生食の量を調節</small> |
| | 5) 生食 50mL 1V ルートフラッシュ |

【投与スケジュール】

| | |
|----------|--|
| Day15、29 | 1) 生食 50mL 1V ルートキープ・ルートフラッシュ |
| | 2) 生食 100mL 1V 60分 オプジーボ (240)mg <small>全量100mLになるように、生食の量を調節</small> |

★ オプジーボ投与時は、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて点滴静注

◆ ヤーボイ投与時は、インラインフィルター(0.2～1.2μmのメンブランフィルター)を用いて点滴静注

特記事項