がん化学療法治療計画書　免疫-⑥ 2022.7

担当医/指導医	/
目的	☐ 積極的治療　☐ 症状緩和 ☐ 術前補助　☐ 術後補助
告知程度	☐全告知 ☐部分告知 ☐未告知
告知内容	☐ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） ☐ 抗癌剤を使用する
服薬指導	☐ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	☐ 確認済み

身長：　　cm	体重：　　Kg
体表面積	m^2

オプジーボ＋ヤーボイ療法（オプジーボ3週間毎）

☐ 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
☐ 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
☐ 根治切除不能な進行・再発の食道癌

投与開始日　　年　　月　　日

1コース6週間

● オプジーボ　360mg　Day1、22　　投与量：　360　mg
（Nivo ： 一般名ニボルマブ、 商品名オプジーボ）

● ヤーボイ　1mg/kg　Day1　　計算量：　mg　投与量：　mg
（ Ipi ： 一般名イピリムマブ、 商品名ヤーボイ）

【投与スケジュール】

Day1	1） 生食　50mL	1V		ルートキープ
	2） 生食　100mL オプジーボ　（　360　）mg	1V	全量100mLになるように、生食の量を調節	60分
	3） 生食　50mL	1V		30分
	4） 生食　50mL ヤーボイ　（　　）mg	1V	全量30mLになるように、生食の量を調節	30分
	5） 生食　50mL	1V		ルートフラッシュ

【投与スケジュール】

Day22	1） 生食　50mL	1V		ルートキープ・ルートフラッシュ
	2） 生食　100mL オプジーボ　（　360　）mg	1V	全量100mLになるように、生食の量を調節	60分

★ オプジーボ投与時は、インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を用いて点滴静注

◆ ヤーボイ投与時は、インラインフィルター（0.2～1.2μmのメンブランフィルター）を用いて点滴静注

特記事項